

III FITyP EN DIABETES

Webinar 5: **RETINOPATÍA DIABÉTICA**



Ángel Modrego Navarro

Coordinador Médico

Centro de Salud Buenavista - Toledo

COORDINADORES:

- Dra. Isabel Egocheaga Cabello
- Dr. Carlos Miranda Fernández-Santos



Lanzamiento online: 11/11/2020

Tutorización hasta el 31/12/2020



El curso se desarrollará en la **plataforma digital SEMG**

Con el aval científico de:



Organizado por:



Con la colaboración de:



Webinar 5: **RETINOPATÍA DIABÉTICA**

La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera en países desarrollados y la primera en personas de 25 a 74 años. Se acepta una prevalencia media de retinopatía diabética en el 40 % de las personas diabéticas.

Las limitaciones actuales para el cribado y diagnóstico de retinopatía de toda la población que padece diabetes son manifiestas e inciden en la sobrecarga asistencial a la que están sometidos los oftalmólogos. El examen de fondo de ojo (FO) con cámara no midriática es el recomendado por las últimas guías de diabetes mellitus editadas (Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines y New Zealand Guideline Management of type 2 Diabetes) como método de cribado.

Existen estudios de coste-efectividad en nuestro medio que han demostrado que la utilización de una cámara de retina no midriática es más eficiente que otros medios para la detección temprana de la retinopatía diabética. Es razonable pensar que sería muy útil la aplicación de un nuevo modelo para la detección de la retinopatía diabética en atención primaria.