



### **EVALUACIÓN INICIAL MÉDICA**

- Grado esperable de cumplimiento
- Función renal y hepática
- Riesgo hemorrágico
- Contraindicaciones para ACO/uso de ACOD
- Interacciones



### **SEGUIMIENTO MÉDICO PROGRAMADO**

- Conocimiento del paciente de su enfermedad y del cumplimiento del tratamiento
- Eventos tromboembólicos y riesgo trombótico
- Sangrados y riesgo de sangrado
- Función renal/hepática
- Efectos secundarios y reacciones adversas del tratamiento
- Revisar medicación actual (interacciones, daño renal, riesgo de sangrado)
- Revisar la continuidad del tratamiento



#### **PERIODICIDAD**

- **1 AÑO**
- **6 MESES:** ClCr 30-60 ml/mn, >75 años, fragilidad.
- **3 MESES:** ClCr 15-30 ml/mn
- Cuando **evento que altere función renal/hepática**



### **SEGUIMIENTO MÉDICO NO PROGRAMADO**

- Sobredosificación / olvido de dosis
- Efectos secundarios o complicaciones (hemorragias...)
- Ajuste de tratamiento (cirugía, procedimientos intercurrentes)
- RAM
- Riesgo de deterioro renal (vómitos, diarrea o fármacos)



### **SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA**

- Revisar uso de medicación, efectos adversos, adherencia
- Reforzar adherencia y cumplimiento
- Control TA
- Solicitar analítica renal/hepática
- Educación sanitaria individual/grupal



#### **PERIODICIDAD**

- Al 1 mes del inicio del tratamiento
- Cada 3-6 meses posteriormente